

abacavir Ziagen® Trizivir® Kivexa® tablet 300 mg	<p>vorm en middel: Tablet omhuld.</p> <p>enteralia info: Mag niet fijngemalen worden.</p> <p>alternatieve vorm: Abacavir (Ziagen®) drank (20 mg/ml)</p>
acamprosaat Campral® tablet 333 mg	<p>vorm en middel: Tablet met maagsapresistente coating.</p> <p>enteralia info: Mag niet fijngemalen worden.</p> <p>verenigbaarheid: Inname met voedsel vermindert risico gastro-intestinale bijwerkingen, tevens wordt opname verminderd. Bij voorkeur innemen tijdens of vlak na de maaltijd.</p> <p>alternatief middel: Disulfiram (Antabus®) bruistablet. Aanwijzingen voor gebruik: laat de voorgeschreven hoeveelheid uiteen vallen in een kwart glas water of vruchtensap; dit mengsel goed roeren en direct innemen.</p>
acarbose Glucobay® tablet 50; 100 mg	<p>vorm en middel: Tablet zonder breukgleuf. Dit geneesmiddel verhoogt de kans op trombose bij bedlegerige patiënten.</p> <p>enteralia info: Mag fijngemalen worden (methode C). Bij sondevoeding is middel gecontraïndiceerd (koolhydraat malabsorptie ongewenst). Voor de maaltijd innemen.</p> <p>alternatief middel: Insuline of overweeg tijdelijk stoppen van het geneesmiddel. Bij sondevoeding patiënten met diabetes mellitus wordt bijna altijd (naar behoefte) insuline gegeven.</p>
acebutolol tablet 200; 400 mg	<p>vorm en middel: Tablet zonder breukgleuf.</p> <p>enteralia info: Mag fijngemalen worden (methode C).</p>
aceclofenac Biofenac® tablet 100 mg	<p>vorm en middel: Tablet omhuld. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8.</p> <p>enteralia info: Mag fijngemalen worden (methode C). Na fijnmalen is de kans op maagklachten groter.</p> <p>verenigbaarheid: Voedsel vermindert opname, dit leidt echter niet tot afname in therapeutisch effect. Kan met en zonder voedsel worden ingenomen.</p> <p>alternatief middel: Ander NSAID.</p>
acenocoumarol tablet 1 mg	<p>vorm en middel: Tablet zonder breukgleuf.</p> <p>enteralia info: Mag fijngemalen worden (methode C). Op vast tijdstip ('s avonds) innemen</p> <p>verenigbaarheid: Bindt mogelijk aan de eiwitten in voedsel. Controle INR bij starten, afbouwen en beëindigen sondevoeding.</p> <p>alternatief middel: LMW heparine s.c.</p>

acetazolamide (1) Diamox Sustet® capsule mga 250; 500 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Capsule met gereguleerde afgifte; fijnmalen geeft mogelijk toxiciteit en te korte werking. Capsules mogen niet geopend worden. Acetazolamide (Diamox®) tablet. Keerdosis en doseerinterval aanpassen.
acetazolamide (2) Diamox® tablet 250 mg	vorm en middel: enteralia info:	Tablet met breukgleuf. Mag fijngemalen worden (methode C).
acetylcysteine (1) Fluimucil® tablet 200; 600 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Bruistablet. Tablet eerst oplossen en laten uitbruisen (methode G). Acetylcysteine (Fluimucil®) drank (20 mg/ml of 40 mg/ml).
acetylcysteine (2) Fluimucil® capsule 200 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Capsule met poeder. Capsules kunnen geopend worden (methode E). Acetylcysteine (Fluimucil®) bruistablet; drank (20 mg/ml of 40 mg/ml). Tablet eerst oplossen en laten uitbruisen (methode G).
acetylcysteine (3) Fluimucil® tablet 600 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Tablet omhuld. Mag niet fijngemalen worden. Acetylcysteine tast rubber en metaal aan. Advies: gebruik materialen gemaakt van plastic. Acetylcysteine (Fluimucil®) drank (20 mg/ml of 40 mg/ml)
acetylcysteine (4) Fluimucil® tablet 200 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid: alternatieve vorm:	Smelttablet. In water (in spuit) oplossen (methode A). Acetylcysteine tast rubber en metaal aan. Advies: gebruik materialen gemaakt van plastic. Voedsel heeft vrijwel geen invloed op absorptie. Kan met en zonder voedsel worden ingenomen. Acetylcysteine (Fluimucil®) drank (20 mg/ml of 40 mg/ml).
acetylsalicylzuur (1) Aspro® Alka Seltzer® Aspirine C® tablet 324; 400; 500 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid:	Bruistablet. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8. In water (in spuit) oplossen (methode A). Bij voorkeur met ruim water op nuchtere maag innemen. Voedsel vermindert opname, dit leidt echter niet tot afname in therapeutisch effect. Bij voorkeur op een lege maag innemen: tenminste een half uur voor de maaltijd.

acetylsalicylzuur (2) tablet 30; 80 mg	vorm en middel: enteralia info:	Disperstablet. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8. In water (in spuit) oplossen (methode A). Bij maagklachten eventueel met voedsel en wat melk innemen.
acetylsalicylzuur (3) Aspirine® tablet 500 mg	vorm en middel: enteralia info:	Kauwtablet. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8. Mag fijngemalen worden (methode C). Bij maagklachten eventueel met voedsel en wat melk innemen.
acetylsalicylzuur (4) Aspirine® tablet EC Protect 100® 100 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid: alternatieve vorm:	Tablet met maagsapresistente coating. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8. Mag niet fijngemalen worden. Voedsel vermindert opname, dit leidt echter niet tot afname in therapeutisch effect. Kan met en zonder voedsel worden ingenomen. Acetylsalicylzuur disperstablet.
acetylsalicylzuur (5) tablet 80 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm: alternatief middel:	Tablet met breukgleuf. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8. Mag fijngemalen worden (methode C). Bij voorkeur met ruim water op nuchtere maag innemen. Acetylsalicylzuur cardio disperstablet. Carbasalaatcalcium (Ascal®) (doseerverhouding: 80:100).
acetylsalicylzuur (6) tablet 500 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatief middel:	Tablet met breukgleuf. NSAID: geeft frequent maagbezwaren. Toelichting in paragraaf 1.4.8. Mag fijngemalen worden (methode C). Bij voorkeur met ruim water op nuchtere maag innemen. Carbasalaatcalcium (Ascal®) (doseerverhouding: 500:600). In water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A).

acetylsalicylzuur (7)tablet
30 mg

enteralia info:

verenigbaarheid:

alternatieve vorm:
alternatief middel:

NSAID: geeft frequent maagbezwaren.

Toelichting in paragraaf 1.4.8.

Mag fijngemalen worden (methode C).

Bij voorkeur met ruim water op nuchtere maag innemen.

Voedsel vertraagt opnamesnelheid.

Bij voorkeur op een lege maag innemen: tenminste een half uur voor de maaltijd. Ter voorkoming van maagklachten, innemen na een maaltijd.

Acetylsalicylzuur neuro dispertablet.

Carbasalaatcalcium (Ascal[®]) doseerverhouding 500:600.**In water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A).****acetylsalicylzuur/
dipyridamol**Asasantin[®]
capsule mga
200/25 mg

vorm en middel:

enteralia info:

alternatieve vorm:

Capsule met gereguleerde afgifte; fijngemalen geeft mogelijk toxiciteit en te korte werking.

Capsules kunnen geopend worden (methode E).

Korrels niet fijngemalen. Goed naspoelen met water, korrels kunnen dunne sondes verstopen.

Carbasalaatcalcium (Ascal[®]) en dipyridamol (Persantin[®]) dragee.**aciclovir (1)**Zovirax[®]
tablet
200; 400; 800 mg

vorm en middel:

enteralia info:

alternatieve vorm:

Disperstablet.

Tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A).Aciclovir (Zovirax[®]) suspensie 40 mg/ml.

Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water.

aciclovir (2)Zovirax[®]
tablet
200; 400; 800 mg

vorm en middel:

enteralia info:

alternatieve vorm:

Tablet zonder breukgleuf.

Kan misselijkheid geven.

Tablet in water (in spuit) uiteen laten vallen (methode A).Aciclovir (Zovirax[®]) suspensie (40 mg/ml).

Vloeistof kan kort voor toediening verdund worden met water.

acipimoxNedios[®]
capsule
250 mg

vorm en middel:

enteralia info:

alternatief middel:

Capsule met poeder.

Capsules kunnen geopend worden (methode E).

Tijdelijk onderbreken van het geneesmiddel is bijna altijd mogelijk.

acitretineNeotigason[®]
capsule
10; 25 mg

vorm en middel:

enteralia info:

verenigbaarheid:

Capsule met poeder.

Zeer gevoelig voor licht en zuurstof.

Capsules kunnen geopend worden (methode E).

Bij voorkeur toevoegen aan een ondoorzichtige vloeistof (bijv. sondevoeding of melk).

Na voor toediening gereed maken direct toedienen.

Voedsel verbetert opname.

acrivastine Semprex® capsule 8 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid:	Capsule met poeder. Capsules kunnen geopend worden (methode E). Voedsel beïnvloedt beschikbaarheid niet. Kan met en zonder voedsel worden ingenomen.
adefovir Hepsera® tablet 10 mg	enteralia info: verenigbaarheid:	Mag fijngemalen worden (methode C). Voedsel vertraagt opnamesnelheid. Kan met en zonder voedsel worden ingenomen.
albendazol Eskazole® tablet 400 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid:	Tablet met breukgleuf. Zwangerschapswaarschuwing: categorie D. Mag fijngemalen worden (methode C). Bij slikklachten: innemen met vla, yoghurt of appelmoes Voedsel verbetert opname. Met (wat) voedsel innemen.
alendroninezuur Fosamax® tablet 10; 70 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid: alternatief middel:	Tablet zonder breukgleuf. Kan maagdarmbijwerkingen geven door irritatie slijmvliezen (ulcerogeen). Mag niet fijngemalen worden. In verticale houding innemen (i.v.m. kans op oesophagitis), tot 30 minuten na inname niet gaan liggen (bisfosfonaten). Wordt slecht opgenomen: (calciumrijk) voedsel vermindert opname. Op een lege maag innemen: half uur voor het ontbijt. Verminderde opname door antacida en middelen die calcium, ijzer, aluminium of magnesium bevatten. Bisfosfonaat ten minste een half uur voor deze middelen innemen. Overweeg tijdelijk stoppen van het geneesmiddel.
alendroninezuur/ colecalfiferol Fosavance® tablet 70 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid: alternatief middel:	Tablet zonder breukgleuf. Kan maagdarmbijwerkingen geven door irritatie slijmvliezen (ulcerogeen). Mag niet fijngemalen worden. In verticale houding innemen (i.v.m. kans op oesophagitis), tot 30 minuten na inname niet gaan liggen (bisfosfonaten). Wordt slecht opgenomen: (calciumrijk) voedsel vermindert opname. Op een lege maag innemen: half uur voor het ontbijt. Verminderde opname door antacida en middelen die calcium, ijzer, aluminium of magnesium bevatten. Bisfosfonaat ten minste een half uur voor deze middelen innemen. Overweeg tijdelijk stoppen van het geneesmiddel.

alfacalcidol Ethalpha® capsule 0,25; 0,5; 1 µg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Harde capsule met vloeistof. Capsules kunnen niet geopend worden. Alfacalcidol (Ethalpha®) druppelvloeistof (2 µg/ml) (ca. 0,1 µg/druppel).
alfuzosine (1) Xatral® tablet 2,5 mg	vorm en middel: enteralia info:	Tablet zonder breukgleuf. Mag fijngemalen worden (methode C).
alfuzosine (2) Xatral XR® tablet mga 10 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Tablet met gereguleerde afgifte, fijnmalen geeft mogelijk toxiciteit en te korte werking. Mag niet fijngemalen worden. Gewone alfuzosine (Xatral®) tablet. Keerdosis en doseerinterval aanpassen.
algeldraat Algeldraat® tablet 500 mg	vorm en middel: enteralia info:	Kauwtablet. Mag fijngemalen worden (methode C).
algeldraat/ magnesiumhydroxide Maalox® Maalox Plus® tablet 100; 200 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid: alternatieve vorm:	Kauwtablet. Mag fijngemalen worden (methode C). Verlaagt de opname van ijzer uit het voedsel. 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen. Verminderde opname van diverse geneesmiddelen. Tenminste 2 uur voor of 2 uur na deze middelen innemen. Aluminiumoxide (Antagel®, Maalox®) suspensie.
algeldraat/ magnesiumtrisilicaat Gaviscon® tablet 250; 500 mg	vorm en middel: enteralia info: alternatieve vorm:	Kauwtablet. Mag fijngemalen worden (methode C). Tijdens de maaltijd innemen. Alginezuur (Gaviscon®) suspensie. Verdun de vloeibare toedieningsvorm. Goed schudden voor gebruik. (Methode F).
alimemazine Nedeltran® tablet 5 mg	vorm en middel: enteralia info: verenigbaarheid:	Tablet zonder breukgleuf. Mag fijngemalen worden (methode C). Voedsel beïnvloedt beschikbaarheid niet. Kan met en zonder voedsel worden ingenomen. Verminderde opname door antacida en middelen die calcium, ijzer, aluminium of magnesium bevatten. Neem eerst dit middel in. Neem 2 uur later het ijzerproduct of het antacidum in.